

ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027
AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE LA 3^E ANNÉE DU SECONDAIRE**Objet : Programme de vaccination en milieu scolaire**

Dans le cadre du programme de vaccination en milieu scolaire, certains vaccins sont offerts gratuitement aux élèves de la 3^e année du secondaire. Au Québec, un jeune âgé de 14 ans ou plus peut consentir seul à la vaccination ainsi qu'aux autres soins de santé. Les parents ou tuteurs n'ont donc pas à donner leur consentement pour ces soins. Cependant, votre consentement sera nécessaire si votre enfant est âgé de 13 ans ou moins lors de la journée de la vaccination.

Vous trouverez ci-dessous des informations pour le soutenir votre enfant dans sa démarche de consentement. Pour plus d'informations sur la vaccination et les maladies évitables par la vaccination, vous pouvez aussi consulter : [Québec.ca/vaccination](https://quebec.ca/vaccination).

VACCINS À RECEVOIR**La vaccination à l'école aura lieu le 7-8-9 OCTOBRE 2026**

Le jour de la vaccination, assurez-vous que votre enfant a son carnet de vaccination en main. Les vaccins administrés y seront inscrits. Il pourra être vacciné contre la diphtérie, coqueluche et le tétanos, ainsi que le méningocoque et l'hépatite B. La carte d'assurance maladie n'est pas requise.

Vaccin contre la diphtérie, coqueluche et le tétanos

Le vaccin combiné qui est utilisé en 3^e année du secondaire protège à la fois contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Puisque ces maladies sont très sérieuses, les nourrissons reçoivent un vaccin dès l'âge de 2 mois contre ces maladies, mais pour conserver la protection, une dose est offerte à votre enfant en troisième secondaire.

Vaccin contre le méningocoque (Men-C ACWY)

Le méningocoque est une bactérie qui peut causer des infections graves, telles qu'une méningite et une infection du sang (septicémie). Une dose de vaccin contre le méningocoque est administrée aux nourrissons. Toutefois, comme l'adolescence est une période à risque pour la méningite, les experts québécois recommandent l'administration d'une dose supplémentaire en 3^e année du secondaire.

Vaccin contre l'hépatite B

L'hépatite B est une infection du foie causée par un virus et pouvant entraîner des complications comme une infection permanente du foie. Une dose de vaccin contre l'hépatite B en utilisant le vaccin combiné contre l'hépatite A et l'hépatite B a été administrée en 4^e année du primaire. La 2^e dose de vaccin contre l'hépatite B est prévue en 3^e secondaire.

ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027
AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE LA 3^E ANNÉE DU SECONDAIRE**Mise à jour du carnet de vaccination**

Au moment de vacciner votre enfant, l'infirmière consultera son dossier et son carnet de vaccination afin de vérifier si sa vaccination est à jour pour l'ensemble de ces maladies : la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, la rubéole, les oreillons, les infections à méningocoque, la varicelle, l'hépatite A, l'hépatite B et les infections à VPH. Si la vaccination de votre enfant n'est pas à jour, l'infirmière pourra alors lui proposer les vaccins manquants. Dans ce cas, **Le 15 Avril 2027, une deuxième séance de vaccination est prévue pour les élèves concernés qui auront besoin de vaccins supplémentaires.**

Votre enfant a reçu une dose de vaccin contre les VPH en 4^e année du primaire et la 2^e dose devait être offerte en 3^e année du secondaire. Toutefois, les expertes et experts québécois recommandent maintenant un calendrier à une seule dose de vaccin contre les VPH. Ce calendrier offre une protection élevée et similaire à celle induite par un calendrier à 2 doses. La 2^e dose prévue en 3^e année du secondaire n'est donc plus requise. Toutefois, si votre enfant n'a pas déjà reçu une dose, il pourra la recevoir cette année.

Il n'y a aucun risque à recevoir plusieurs vaccins lors d'une même séance de vaccination. Cette pratique est sécuritaire et répandue dans le monde entier. Il est important de recevoir toutes les doses requises pour avoir une bonne protection.

Votre enfant recevra de l'information sur les possibles réactions que peuvent causer les vaccins et sur les moyens à prendre pour les soulager. Ces réactions peuvent apparaître dans les 24 à 72 heures suivant l'administration des vaccins et sont de courte durée.

Nous vous remercions de votre collaboration.